

CUESTIONARIO NUMERO 41

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LAS CADERAS

- 1. Enunciado correcto en displasia del desarrollo de la cadera:**
 - a. Es un proceso estático
 - b. Es un proceso dinámico
 - c. Es más frecuente en presentación de hombros
 - d. Es más frecuente en varones gemelos
 - e. El tratamiento precoz es exitoso en un 40%-50% de los casos

- 2. Enunciado correcto en displasia del desarrollo de la cadera:**
 - a. El índice radiológico acetabular considerado normal es menor de 28 grados
 - b. La limitación a la aducción es un signo patognomónico
 - c. Es más frecuente en neonatos con presentación cefálica
 - d. En neonatos de alto riesgo, se recomienda examen radiológico al nacimiento
 - e. Es recomendable examen ecográfico a partir del 3er mes de vida

- 3. Enunciado correcto acerca de la displasia del desarrollo de la cadera:**
 - a. La limitación de la abducción es el signo más importante en el lactante menor
 - b. El signo de Galeazzi es precoz
 - c. La asimetría de pliegues del muslo es el signo de mayor importancia clínica
 - d. La limitación en la abducción es el signo más importante en el lactante mayor
 - e. Son correctas a) y c)

- 4. En neonato con examen físico normal e historia familiar de displasia del desarrollo de la cadera, se recomienda:**
 - a. Ecografía al nacimiento
 - b. Radiografía al mes de vida
 - c. Ecografía a los 15 - 20 días de vida
 - d. Radiografía a los tres meses de vida
 - e. Ecografía a los 3 meses de vida

- 5. En el lactante menor la maniobra diagnóstica más útil para detectar displasia del desarrollo de la cadera es:**
 - a. La limitación de la aducción
 - b. La limitación de la abducción
 - c. La maniobra de Ortoloni
 - d. La maniobra de Putti
 - e. La maniobra telescópica

Respuestas Cuestionario # 41

Respuestas:

1. b
2. a
3. a
4. c
5. b